



Наименование структурного подразделения:	Все структурные подразделения		
Названия документа:	СОП «Надевание и снятие нестерильных перчаток»		
Утвержден:	Руководитель ГКП на ПХВ «ЛГП» Чалкаров А.Б.		
Дата утверждения:			
Разработчик:	<i>Должность</i>	<i>Ф.И.О.</i>	<i>Подпись</i>
	Врач эпидемиолог	Тургимбаева Г.А.	
	Заведующий отделением	Садыков Г.Б.	
Согласовано:	Заместитель гл.врача по лечебному делу	Анаркулова У.О.	
	Заместитель гл.врача по контролю качества мед.услуг	Рысбаев С.Т.	
	Врач эксперт		
Дата согласования:	04.01.2024г.		
Дата введения в действие	04.01.2024г.		
Версия №	Копия № _____	<u>04</u> /01_____ / 2024г.	
		Ф.И.О. _____	
		Подпись _____	

Дата последнего пересмотра « 04 » « 01 » 2024г

Дата следующего пересмотра « _____ » « _____ » 2027г



Стандарт операционных процедур: Надевание и снятие нестерильных перчаток

1. **Цель:** создание барьера, препятствующего распространению и передаче инфекции.

2. **Область применения:** клинические и неклинические отделения

3. **Ответственность:** весь медицинский персонал

4. **Определение:**

Нестерильные перчатки — одноразовые перчатки, являющиеся медицинской принадлежностью для обеспечения безопасности персонала и пациента. Они обеспечивают соблюдение санитарно-эпидемиологические нормы в медицинских организациях, ограничивая воздействие на пациентов инфекционных веществ. Нестерильные перчатки также служат для защиты медицинских работников от заболеваний в случае контакта с жидкостями организма.

5. **Ресурсы/оснащение:**

- 1) нестерильные перчатки;
- 2) одноразовые бумажные полотенца или салфетки;
- 3) антисептическое мыло;
- 4) кожный антисептик для обработки рук;
- 5) КБСУ для медицинских отходов класса «Б».

6. **Основная часть процедуры:**

- 1) Снять кольца с пальцев рук;
- 2) Провести обработку рук согласно Методическим рекомендациям по обработке рук сотрудников медицинских организаций РК;
- 3) Достать перчатку из упаковки (коробки);
- 4) Необходимо прикоснуться только к той части перчатки, которая будет находиться на запястье (верхний край манжеты);
- 5) Надеть первую перчатку;
- 6) Достать вторую перчатку рукой без перчатки и прикоснуться к той части перчатки, которая будет находиться на запястье;
- 7) Чтобы избежать прикосновения руки с надетой перчаткой к коже предплечья, необходимо вывернуть наружную поверхность перчатки так, чтобы надеть ее на согнутые пальцы руки в перчатке, это позволит надеть вторую перчатку (Рис.1);



- 8) После того, как перчатки надеты, нельзя прикасаться к любым объектам внешней среды, контакт с которыми является показанием для смены перчаток;
- 9) Провести запланированную процедуру в перчатках;
- 10) По окончании процедуры снять перчатки, выворачивая их наизнанку (Рис.2);
- 11) Утилизировать использованные перчатки в КБСУ для медицинских отходов класса «Б»;
- 12) Провести обработку рук согласно Методическим рекомендациям по обработке рук сотрудников медицинских организаций РК.


Рис. 1 Порядок надевания нестерильных перчаток.




1. Достаньте перчатку из упаковки (коробки).

2. Прикасайтесь только к той части перчатки, которая будет находиться на запястье (верхний край манжеты).


3. Наденьте первую перчатку.



4. Возьмите вторую перчатку рукой без перчатки и прикасайтесь к той части перчатки, которая будет находиться на запястье.



5. Чтобы избежать прикосновения руки с надетой перчаткой к коже предплечья, выверните наружную поверхность перчатки так, чтобы надеть ее на согнутые пальцы руки в




6. После того, как перчатки надеты, нельзя прикасаться к любым объектам внешней среды, контакт с которыми является показанием для смены перчаток.




перчатке, это позволит вам надеть вторую перчатку.


Рис.2 Порядок снятия нестерильных перчаток.



1. Захватите пальцами одну перчатку на уровне запястья, чтобы снять ее, не дотрагиваясь к коже предплечья, и стягивайте ее с руки так, чтобы перчатка вывернулась наизнанку.



2. Держите снятую перчатку в руке с надетой перчаткой, подведите пальцы руки, с которой снята перчатка, внутрь – между второй перчаткой и запястьем. Снимите вторую перчатку, скатывая ее с руки, и вложите в первую перчатку.



3. Утилизируйте снятые перчатки в отходы класса Б

7. Примечания:

1) При проведении манипуляции стараться не дотрагиваться тех мест, которые потенциально могут быть контаминированы и свести к минимуму необходимость замены перчаток;

2) Использование перчаток никоим образом не меняет показания для проведения обработки рук и не заменяет такие меры как обработка рук кожным антисептиком или мытье с мылом и водой;

3) Если целостность перчатки нарушена (например, если она проколота), ее следует заменить как можно быстрее и провести обработку рук согласно правилам Поликлиники.



8. Указание условия пересмотра СОП: Пересмотр СОП проводится 1 раз в 3 года или при появлении новых требований.

2. Нормативные ссылки:

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению» № ҚР ДСМ-175/2020;
- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 ноября 2021 года «Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций» « № ҚР ДСМ – 111.
- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 августа 2021 года № «Об утверждении «Правил оказания первичной медико-санитарной помощи» ҚР ДСМ-90
- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 декабря 2022 года № ҚР ДСМ-151. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи" ҚР ДСМ -151/2022; .

Лист регистрации изменений

№	№ раздела, пункта стандарта, в которое внесено изменение	Дата внесения изменения	ФИО лица, внесшего изменения

